

De blandede partielle afledede er ens

Vi beviser sætning 10 på s 268:

Sætning 10: Blandede afledede

Hvis de dobbelt afledede og de blandede afledede af f er kontinuerte,

så er $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$.

Denne funktion betegnes normalt f''_{xy} , og den kaldes den blandede afledede af f .

Betragt et bestemt punkt (a, b) , hvor betingelserne i sætningen er opfyldt i et område omkring punktet. Vi regner indenfor dette område.

Vi opstiller følgende identitet:

$$(f(a+h, b+k) - f(a+h, b)) - (f(a, b+k) - f(a, b)) = (f(a+h, b+k) - f(a, b+k)) - (f(a+h, b) - f(a, b)) \quad (*)$$

og vil se, hvad der sker når vi lader h og k gå mod 0.

Vi definerer funktionerne:

$$u(x) = f(x, b+k) - f(x, b) \quad \text{og} \quad v(y) = f(a+h, y) - f(a, y)$$

Læg mærke til, at når vi differentierer $u(x)$ får vi den første partielle afledede for funktionen f i spil, og når vi differentierer $v(y)$ får vi den anden partielle afledede for funktionen f i spil:

$$u'(x) = f'_x(x, b+k) - f'_x(x, b) \quad \text{og} \quad v'(y) = f'_y(a+h, y) - f'_y(a, y) \quad (**)$$

Ideen i beviset er nu at bruge middelværdisætningen to gange på henholdsvis udtrykket til venstre og på udtrykket til højre i (*)

$$\text{Venstre side i (*)} = u(a+h) - u(a) = u'(c) \cdot h = (f'_x(c, b+k) - f'_x(c, b)) \cdot h, \text{ hvor } c \text{ ligger i }]a; a+h[$$

$$\text{Højre side i (*)} = v(b+k) - v(b) = v'(d) \cdot k = (f'_y(a+h, d) - f'_y(a, d)) \cdot k, \text{ hvor } d \text{ ligger i }]b; b+k[$$

Vi anvender nu igen middelværdisætningen på de to parenteser med de første afledede:

$$\text{Venstre side fortsat: } (f'_x(c, b+k) - f'_x(c, b)) \cdot h = (f''_{xy}(c, e) \cdot k) \cdot h = f''_{xy}(c, e) \cdot k \cdot h, \text{ hvor } e \text{ ligger i }]b; b+k[$$

$$\text{Højre side fortsat: } (f'_y(a+h, d) - f'_y(a, d)) \cdot k = (f''_{yx}(g, d) \cdot h) \cdot k = f''_{yx}(g, d) \cdot h \cdot k, \text{ hvor } g \text{ ligger i }]a; a+h[$$

Samlet har vi derfor:

$$\text{Venstre side i (*)} = f''_{xy}(c, e) \cdot k \cdot h, \text{ hvor } c \text{ ligger i }]a; a+h[, \text{ og } e \text{ ligger i }]b; b+k[$$

$$\text{Højre side i (*)} = f''_{yx}(g, d) \cdot h \cdot k, \text{ hvor } g \text{ ligger i }]a; a+h[, \text{ og } d \text{ ligger i }]b; b+k[$$

Men venstre og højre sider er jo ens!, så vi har:

$$f''_{xy}(c, e) \cdot k \cdot h = f''_{yx}(g, d) \cdot h \cdot k, \text{ hvor } c \text{ og } g \text{ ligger i }]a; a+h[, \text{ og } d \text{ og } e \text{ ligger i }]b; b+k[$$

$$\text{dvs } f''_{xy}(c, e) = f''_{yx}(g, d), \text{ hvor } c \text{ og } g \text{ ligger i }]a; a+h[, \text{ og } d \text{ og } e \text{ ligger i }]b; b+k[\quad (***)$$

Vi udnytter nu, at de dobbelt afledede er kontinuerte.

Når h går mod 0, vil c og g gå mod a . Og når k går mod 0, vil d og e gå mod b .

Dvs: Når $(h, k) \rightarrow (0, 0)$, vil både $(c, e) \rightarrow (a, b)$ og $(g, d) \rightarrow (a, b)$. Men så vil

$$f''_{xy}(c, e) \rightarrow f''_{xy}(a, b) \text{ og } f''_{yx}(g, d) \rightarrow f''_{yx}(a, b)$$

Men de to dobbelt afledede er identiske hele vejen, som (***) siger.

Så er også grænseværdierne ens: $f''_{xy}(a, b) = f''_{yx}(a, b)$, hvorved vi har vist sætningen.